

ANTIRRETROVIRALES COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA (septiembre 2019): dosificación en el adulto y presentaciones comerciales.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO [®]	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
ITIAN	ABACAVIR	300 mg/12 h oral o 600 mg/24h	Indiferente	ZIAGEN [®]	300 mg		20 mg/ml		
	DIDANOSINA	≥60kg 400 mg/24h <60 kg 250 mg/24h	En ayunas	VIDEX [®]			Polvo 2g rec. con antiácidos (5 mg/ml o 10 mg/ml)		
	EMTRICITABINA	200 mg/24h	Indiferente	EMTRIVA [®]	200 mg		10 mg/ml		
	LAMIVUDINA	300 mg/24h, en 1-2 dosis	Indiferente	EPIVIR [®]	150 mg 300 mg		10 mg/ml		
	TENOFOVIR	245 mg/24h	Con alimentos	VIREAD [®] y genéricos	123 mg 163 mg 204 mg 245 mg			33 mg/g	
	TENOFOVIR ALAFENAMIDA	25 mg/24h (10 mg/24h si RTV o COBI)	Con alimentos	VEMLIDY [®]	25 mg				
	ZIDOVUDINA	250-300 mg/12h	Indiferente	RETROVIR [®] y genéricos		250 mg	10 mg/ml		2mg/ml
Asociaciones ITIAN	ABACAVIR/LAMIVUDINA	1 comp/24h	Indiferente	KIVEXA [®] y genéricos	600/300 mg				
	EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA	1 comp/24h	Indiferente	DESCOVY [®]	200/10 mg 200/25 mg				
	ENTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	1 comp/24h	Con alimentos	TRUVADA [®] y genéricos	200/245 mg				
	LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA	1 comp/12h	Indiferente	COMBIVIR [®] y genéricos	150/300 mg				
	ZIDOVUDINA/LAMIVUDINA/ABACAVIR	1 comp/12h	Indiferente	TRIZIVIR [®]	300/150/300 mg				

Actualización febrero 2020. www.interaccionesvih.com (ver "aviso legal" y "términos y condiciones") en nuestra web.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO ^o	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
ITINN	DORAVIRINA*	100mg/24h. (Si inductores moderados del CYP3A4:100 mg/12h)	Indiferente	PIFELTRO®*	100 mg				
	EFAVIRENZ	600 mg/día	En ayunas al acostarse	STOCRIN®, SUSTIVA® y genéricos	200 mg 600 mg	50 mg 100 mg 200 mg			
	ETRAVIRINA	200 mg/12h	Con alimentos	INTELENCE®	100 mg 200 mg				
	NEVIRAPINA	200 mg/24h oral las primeras 2 semanas y luego 200/12h (formulac. normal) ó 400 mg/24h (formulac, retard).	Indiferente	VIRAMUNE® y genéricos	200 mg (liberac. normal) 400 mg (liberac. prolongada)		50 mg/5 ml		
	RILPIVIRINA	25 mg/24h	Con alimentos	EDURANT® LONG ACTING (E.C.) ^s	25 mg				300 mg/ml
Asociaciones ITINN con ITIAN	DORAVIRINA*/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	1 comp /24h	Indiferente	DELSTRIGO®*	100/300/245 mg.				
	EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	1 comp /24h	En ayunas al acostarse	ATRIPLA® y genéricos	600/200/245 mg				
	RILPIVIRINA/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	1 comp /24h	Con alimentos	EVIPLERA®	25/200/245 mg				
	RILPIVIRINA/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA	1 comp /24h	Con alimentos	ODEFSEY®	25/200/25 mg				

Actualización febrero 2020. www.interaccionesvih.com (ver "aviso legal" y "términos y condiciones") en nuestra web.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO ^b	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
IP	ATAZANAVIR	No potenciado: 400 mg/día (solo <i>naive</i>) Potenciado con COBI (ver COBI) o RTV: ATV/r 300/100 mg/24h	Con alimentos	REYATAZ®		150 mg 200 mg 300 mg			
	DARUNAVIR	Siempre potenciado con COBI (ver COBI) o RTV: DRV/r 800 mg/100 mg/24 h (<i>naive</i>) ó 600/100 mg/12 h (pretratados)	Con alimentos	PREZISTA®	75 mg 150 mg 400 mg 600 mg 800 mg		100 mg/ml		
	FOSAMPRE-NAVIR	Siempre potenciado: FPV/r 700/100mg/12h	Comprimidos: indiferente Solución oral: en ayunas en adultos y con alimentos en niños	TELZIR®	700 mg		50 mg/ml		
	LOPINAVIR/RITONAVIR	800/200 mg/24h, en 1-2 dosis	Comprimidos: indiferente Solución oral: y con alimentos	KALETRA® y genérico	100/25 mg 200/50 mg		80/20 mg/ml		
	RITONAVIR	Potenciador: 100 mg/24h, 100 mg/12h o 200 mg/12h, según fármaco acompañante	Con alimentos	NORVIR® y genérico	100 mg		10 mg/ml		
	TIPRANAVIR	Siempre potenciado TPV/r 500/200 mg/12h	Con alimentos	APTIVUS®		250 mg	100 mg/ml		
IP potenciados	ATAZANAVIR/COBICISTAT	1 comp /24h	Con alimentos	EVOTAZ®	300/150 mg				
	DARUNAVIR/COBICISTAT	1 comp /24h	Con alimentos	REZOLSTA®	800/150 mg				
Asociaciones de IP con ITIAN	DARUNAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABIN A/ TENOFOVIR ALAFENAMIDA	1 comp /24h	Con alimentos	SYMTUZA®	800/150/200 /10 mg				

Actualización febrero 2020. www.interaccionesvih.com (ver "aviso legal" y "términos y condiciones") en nuestra web.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO ⁸	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
INI	DOLUTEGRAVIR	50 mg/24 h. Si resistencia a INI o inductor potente CYP3A4 50 mg/12h	Indiferente (si riesgo de resistencias o inductores, con alimentos)	TIVICAY®	10 mg 25 mg 50 mg				
	RALTEGRAVIR	BID: 400 mg/12h QD: 1200 mg/24h	Indiferente	ISENTRESS®	25 mg 100 mg 400 mg 600 mg		sobres de 100 mg para diluir en 10 ml de agua (10 mg/ml) ⁸		
Asociaciones de INI con ITIAN	BICTEGRAVIR/EMTRICITABINA/TENOFOVIR/ALAFENAMIDA	1 comp/24h	Indiferente	BIKTARVY®	50/200/25 mg				
	DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINA	1 comp/24h (si inductor potente CYP3A4, añadir 50 mg DTG separado 12h)	Indiferente	TRIUMEQ®	50/600/300 mg				
	ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINA/TENOFOVIR/ALAFENAMIDA	1 comp/24h (dosis de 10 mg TAF con RTV o COBI)	Con alimentos	GENVOYA®	150/150/200/10 mg y 150/150/200/25 mg				
	ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINA/TENOFOVIR/DISOPROXIL	1 comp/24h	Con alimentos	STRIBILD®	150/150/200/245 mg				
Inhibidores de los correceptores CCR5	MARAVIROC	300 mg/12h (600 mg/12h si solo inductores potentes CYP3A4) (150 mg/12h si inhibidores potentes CYP3A4, aunque se asocien inductores)	Indiferente	CELSENTRI®	150 mg 300 mg				
Inhibidor de la fusión	ENFUVRTIDE	90 mg/12h sc	No procede	FUZEON®					90 mg/ml.

⁸ Disponible a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales

Actualización febrero 2020. www.interaccionesvih.com (ver "aviso legal" y "términos y condiciones") en nuestra web.

Ⓞ En adultos con funciones hepática y renal normales

* Próxima comercialización.

Se resaltan en verde los más habitualmente empleados en la actualidad

Actualización febrero 2020. www.interaccionesvih.com (ver "aviso legal" y "términos y condiciones") en nuestra web.