ANTIRRETROVIRALES COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA (enero 2024): dosificación en el adulto y presentaciones comerciales.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO[Φ]	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	**Cápsulas**	**Suspensión oral**	**Granulado**	**Vial inyectable**
ITIAN	Abacavir (ABC)	300 mg/12 h oral o 600 mg/24h	Indiferente	ZIAGEN ® y genéricos	300 mg		20 mg/ml		
	Emtricitabina (FTC)	200 mg/24h	Indiferente	EMTRIVA®		200 mg	10 mg/ml		
	Lamivudina (3TC)	300 mg/24h, en 1-2 dosis	Indiferente	EPIVIR ® y genéricos	150 mg 300 mg		10 mg/ml		
	Tenofovir (TFV)	245 mg/24h	Con alimentos	VIREAD® y genéricos	123 mg 163 mg 204 mg 245 mg			33 mg/g	
	Tenofovir alafenamida (TAF)	25 mg/24h (10 mg/24h si RTV o COBI)	Con alimentos	VEMLIDY®	25 mg				
	Zidovudina (AZT)	250-300 mg/12h	Indiferente	RETROVIR® y genéricos		250 mg	10 mg/ml		2mg/ml
Asociaciones ITIAN	ABC/3TC	1 comp/24h	Indiferente	KIVEXA® y genéricos	600/300 mg				
	FTC/TAF	1 comp/24h	Indiferente	DESCOVY®	200/10 mg 200/25 mg				
	FTC/TFV	1 comp/24h	Con alimentos	TRUVADA® y genéricos	200/245 mg				
	3TC/AZT	1 comp/12h	Indiferente	COMBIVIR® y genéricos	150/300 mg				
	AZT/3TC/ABC	1 comp/12h	Indiferente	TRIZIVIR®	300/150/300 mg				

Actualización enero 2024 www.interaccionesvih.com (ver "aviso legal" y "términos y condiciones") en nuestra web.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO[Φ]	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
ITINN	Doravirina (DOR)	100mg/24h (si inductores moderados del CYP3A4:100 mg/12h)	Indiferente	PIFELTRO®	100 mg				
	Efavirenz (EFV)	600 mg/día	En ayunas al acostarse	Genéricos	600 mg				
	Etravirina (ETR)	200 mg/12h	Con alimentos	INTELENCE®	200 mg				
	Nevirapina (NVP)	200 mg/24h oral las primeras 2 semanas y luego 200/12h (formulac. normal) ó 400 mg/24h (formulac, retard).	Indiferente	VIRAMUNE® y genéricos	200 mg (liberac. normal) 400 mg (liberac. prolongada)		50 mg/5 ml		
	Rilpivirina (RPV)	- Oral: 25 mg/24h - IM: 900 mg (dosis única) + 600 mg/mes o 900 mg/2 meses	Con alimentos	EDURANT® REKAMBYS ® L.P.	25 mg				900 mg (300 mg/ml, 3 ml)
Asociaciones ITINN con ITIAN	EFV/FTC/TFV	1 comp /24h	En ayunas al acostarse	Genéricos	600/200/245 mg				
	RPV/FTC/TFV	1 comp /24h	Con alimentos	EVIPLERA®	25/200/245 mg				
	RPV/FTC/TAF	1 comp /24h	Con alimentos	ODEFSEY®	25/200/25 mg				

Actualización enero 2024 www.interaccionesvih.com (ver “aviso legal” y “términos y condiciones”) en nuestra web.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO[Φ]	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	**Cápsulas**	**Suspensión oral**	**Granulado**	**Vial inyectable**
IP	Atazanavir (ATV)	Potenciado con COBI (ver COBI) o RTV: ATV/c300/150 mg/24h ATV/r 300/100 mg/24h	Con alimentos	Genéricos		200 mg 300 mg			
	Darunavir (DRV)	Siempre potenciado con COBI (ver COBI) o RTV: DRV/r 800 mg/100 mg/24 h (*naive*) ó 600/100 mg/12 h (pretratados)	Con alimentos	PREZISTA® y genéricos	400 mg 600 mg 800 mg		100 mg/ml		
	Fosamprenavir (FPV)	Siempre potenciado: FPV/r 700/100mg/12h	Comp: indiferente Solución oral: adultos en ayunas; niños con alimentos	TELZIR®	700 mg				
	Lopinavir/ Ritonavir (LPV/r)	800/200 mg/24h, en 1-2 dosis	Comp: indiferente Solución oral: y con alimentos	KALETRA® y genérico	100/25 mg 200/50 mg		80/20 mg/ml		
	Ritonavir (RTV)	Potenciador: 100 mg/24h, 100 mg/12h o 200 mg/12h, según fármaco acompañante	Con alimentos	NORVIR® y genérico	100 mg		100 mg (polvo)		
IP potenciados	ATV/cobicistat	1 comp /24h	Con alimentos	EVOTAZ®	300/150 mg				
	DRV/cobicistat	1 comp /24h	Con alimentos	REZOLSTA®	800/150 mg				
Asociaciones de IP con ITIAN	DRV/cobi/FTC/TAF	1 comp /24h	Con alimentos	SYMTUZA®	800/150/200/10 mg				

Actualización enero 2024 www.interaccionesvih.com (ver "aviso legal" y "términos y condiciones") en nuestra web.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO[Φ]	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
INI	Dolutegravir (DTG)	50 mg/24 h. Si resistencia a INI o inductor potente CYP3A4 50 mg/12h Comp dispersables ver ficha técnica*	Indiferente (si riesgo de resistencias, inductores, o cationes, con alimentos)	TIVICAY®	10 mg 25 mg 50 mg 5 mg (comp dispersable)*				
	Raltegravir (RAL)	BID: 400 mg/12h QD: 1200 mg/24h Comp masticables ver ficha técnica**	Indiferente	ISENTRESS ®	25 y 100 mg (comp mastic.) 400 y 600 mg**				
	Cabotegravir (CAB)	Oral: 30mg/24h, 1 mes (opcional) IM: 600 mg (dosis única) + 400 mg/mes o 600 mg/2 meses	Oral: indiferente IM: no procede	VOCABRIA®	30 mg				600 mg (200 mg/ml, 3 ml)
Asociaciones de INI con ITIAN	Bictegravir (BIC)/FTC/TAF	1 comp/24h	Indiferente	BIKTARVY®	50/200/25 mg				
	DTG/3TC	1 comp/24h	Indiferente	DOVATO®	50/300 mg				
	DTG/ABC/3TC	1 comp/24h (si inductor potente CYP3A4, añadir 50 mg DTG separado 12h)	Indiferente	TRIUMEQ®	50/600/300 mg 5/60/30 mg				
	EVG/cobi/FTC/TAF	1 comp/24h (con COBI: 10 mg TAF)	Con alimentos	GENVOYA®	150/150/200/10 mg				
	EVG/cobi/FTC/TDF	1 comp/24h	Con alimentos	STRIBILD ®	150/150/200/245 mg				
Asociaciones de INI con ITINN	DTG/RPV	1 comp/24h	Con alimentos	JULUCA ®	50/25 mg				
Inhibidores de los correceptores CCR5	Maraviroc (MVC)	300 mg/12h (600 mg/12 h si inductores potentes CYP3A4) (150 mg/12h si inhibidores potentes ± inductores CYP3A4	Indiferente	CELSENTRI ®	150 mg 300 mg				

Actualización enero 2024 www.interaccionesvih.com (ver "aviso legal" y "términos y condiciones") en nuestra web.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO[Φ]	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	**Cápsulas**	**Suspensión oral**	**Granulado**	**Vial inyectable**
Inhibidor de la fusión	Enfuvirtide (ENF, T20)	90 mg/12h sc	No procede	FUZEON®					90 mg/ml.
Inhibidor de la unión a CD4	Fostemsavir (FTR)	600 mg/12h	Indiferente	RUKOBIA®	600 mg (L.P.)				
Inhibidor de la cápside	Lenacapavir (LEN)	Comp 300 mg: 2 comp día +1,+2, 1 comp día +8, seguido de 927 mg (2 iny S.C.) cada 6 meses	Indiferente	SUNLENCA	300 mg[δ]				464 mg[δ]
Potenciador farmacocinéti-co	Cobicistat	150 mg/24h	Con alimentos	TYBOST®	150 mg				

[δ] Disponible a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales. Pendiente de comercialización en España.

* Dolutegravir: los comprimidos dispersables de 5 mg no son bioequivalentes con los comprimidos de 50 mg. La dosis equivalente para adultos de dolutegravir en comprimidos dispersables de 5 mg es de 30 mg (seis comprimidos).

** Raltegravir: los comprimidos masticables no son bioequivalentes con los normales, por lo tanto, no son intercambiables a las mismas dosis.

[Φ] En adultos con funciones hepática y renal normales

Abreviaturas: I.M. (intramuscular), L.P. (Liberación Prolongado); S.C. (subcutáneo).

Actualización enero 2024 www.interaccionesvih.com (ver “aviso legal” y “términos y condiciones”) en nuestra web.