

ANTIRRETROVIRALES COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA (noviembre 2020): dosificación en el adulto y presentaciones comerciales.

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO [®]	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
ITIAN	Abacavir (ABC)	300 mg/12 h oral o 600 mg/24h	Indiferente	ZIAGEN [®] y genéricos	300 mg		20 mg/ml		
	Didanosina (ddl)		En ayunas	VIDEX [®]			Polvo 2g rec. con antiácidos (5 mg/ml o 10 mg/ml) (med extranjeros)		
	Emtricitabina (FTC)	200 mg/24h	Indiferente	EMTRIVA [®]	200 mg		10 mg/ml		
	Lamivudina (3TC)	300 mg/24h, en 1-2 dosis	Indiferente	EPIVIR [®] y genéricos	150 mg 300 mg		10 mg/ml		
	Tenofovir (TFV)	245 mg/24h	Con alimentos	VIREAD [®] y genéricos	123 mg 163 mg 204 mg 245 mg			33 mg/g	
	Tenofovir alafenamida (TAF)	25 mg/24h (10 mg/24h si RTV o COBI)	Con alimentos	VEMLIDY [®]	25 mg				
	Zidovudina (AZT)	250-300 mg/12h	Indiferente	RETROVIR [®] y genéricos		250 mg	10 mg/ml		2mg/ml
Asociaciones ITIAN	ABC/3TC	1 comp/24h	Indiferente	KIVEXA [®] y genéricos	600/300 mg				
	FTC/TAF	1 comp/24h	Indiferente	DESCOVY [®]	200/10 mg 200/25 mg				
	FTC/TFV	1 comp/24h	Con alimentos	TRUVADA [®] y genéricos	200/245 mg				
	3TC/AZT	1 comp/12h	Indiferente	COMBIVIR [®] y genéricos	150/300 mg				
	AZT/3TC/ABC	1 comp/12h	Indiferente	TRIZIVIR [®]	300/150/300 mg				

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO ^o	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
ITINN	Doravirina (DOR)	100mg/24h. (Si inductores moderados del CYP3A4:100 mg/12h)	Indiferente	PIFELTRO®	100 mg				
	Efavirenz (EFV)	600 mg/día	En ayunas al acostarse	SUSTIVA® y genéricos	200 mg 600 mg	50 mg 100 mg 200 mg			
	Etravirina (ETR)	200 mg/12h	Con alimentos	INTELENCE®	200 mg				
	Nevirapina (NVP)	200 mg/24h oral las primeras 2 semanas y luego 200/12h (formulac. normal) ó 400 mg/24h (formulac, retard).	Indiferente	VIRAMUNE® y genéricos	200 mg (liberac. normal) 400 mg (liberac. prolongada)		50 mg/5 ml		
	Rilpivirina (RPV)	25 mg/24h	Con alimentos	EDURANT® LONG ACTING (E.C.) ^o	25 mg				300 mg/ml
Asociaciones ITINN con ITIAN	DOR/3TC/TDF	1 comp /24h	Indiferente	DELSTRIGO® ^o	100/300/245 mg.				
	EFV/FTC/TFV	1 comp /24h	En ayunas al acostarse	ATRIPLA® y genéricos	600/200/245 mg				
	RPV/FTC/TFV	1 comp /24h	Con alimentos	EVIPLERA®	25/200/245 mg				
	RPV/FTC/TAF	1 comp /24h	Con alimentos	ODEFSEY®	25/200/25 mg				

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO ^o	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
IP	Atazanavir (ATV)	Potenciado con COBI (ver COBI) o RTV: ATV/c300/150 mg/24h ATV/r 300/100 mg/24h	Con alimentos	REYATAZ® y genéricos		150 mg 200 mg 300 mg			
	Darunavir (DRV)	Siempre potenciado con COBI (ver COBI) o RTV: DRV/r 800 mg/100 mg/24 h (naïve) ó 600/100 mg/12 h (pretratados)	Con alimentos	PREZISTA® y genéricos	400 mg 600 mg 800 mg		100 mg/ml		
	Fosamprenavir (FPV)	Siempre potenciado: FPV/r 700/100mg/12h	Comp: indiferente Solución oral: adultos en ayunas niños con alimentos	TELZIR®	700 mg		50 mg/ml		
	Indinavir (IDV)	IDV/r 400/100 mg/12h	Con alimentos	CRIVAN®		400 mg			
	Lopinavir/ Ritonavir (LPV/r)	800/200 mg/24h, en 1-2 dosis	Comp: indiferente Solución oral: y con alimentos	KALETRA® y genérico	100/25 mg 200/50 mg		80/20 mg/ml		
	Ritonavir (RTV)	Potenciador: 100 mg/24h, 100 mg/12h o 200 mg/12h, según fármaco acompañante	Con alimentos	NORVIR® y genérico	100 mg		10 mg/ml (sobres 100 mg)		
	Saquinavir (SQV)	Siempre potenciado SQV/r 1000/100 mg/12h	Con alimentos	INVIRASE®	500 mg				
	Tipranavir	Siempre potenciado TPV/r 500/200 mg/12h	Con alimentos	APTIVUS®		250 mg	100 mg/ml		
IP potenciados	ATV/cobicistat	1 comp /24h	Con alimentos	EVOTAZ®	300/150 mg				
	DRV/cobicistat	1 comp /24h	Con alimentos	REZOLSTA®	800/150 mg				
Asociaciones de IP con ITIAN	DRV/cobi/FTC/TAF	1 comp /24h	Con alimentos	SYMTUZA®	800/150/200/1 0 mg				

	PRINCIPIO/S ACTIVO/S	DOSIFICACIÓN HABITUAL EN EL ADULTO ^o	ADMINISTRACION CON RESPECTO A LAS COMIDAS	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIONES COMERCIALES				
					Comprimidos	Cápsulas	Suspensión oral	Granulado	Vial inyectable
INI	Dolutegravir (DTG)	50 mg/24 h. Si resistencia a INI o inductor potente CYP3A4 50 mg/12h	Indiferente (si riesgo de resistencias o inductores, con alimentos)	TIVICAY®	10 mg 25 mg 50 mg				
	Raltegravir (RAL)	BID: 400 mg/12h QD: 1200 mg/24h	Indiferente	ISENTRESS®	25 y 100 mg (comp mastic.) 400 y 600 mg		sobres de 100 mg para diluir en 10 ml de agua (10 mg/ml) ^o		
Asociaciones de INI con ITIAN	Bictegravir (BIC)/FTC/TAF	1 comp/24h	Indiferente	BIKTARVY®	50/200/25 mg				
	DTG/3TC	1 comp/24h	Indiferente	DOVATO®	50/300 mg				
	DTG/ABC/3TC	1 comp/24h (si inductor potente CYP3A4, añadir 50 mg DTG separado 12h)	Indiferente	TRIUMEQ®	50/600/300 mg				
	EVG/cobiFTC/TAF	1 comp/24h (dosis de 10 mg TAF con RTV o COBI)	Con alimentos	GENVOYA®	150/150/200/10 mg y 150/150/200/25 mg				
	EVG/cobi/FTC/TDF	1 comp/24h	Con alimentos	STRIBILD®	150/150/200/245 mg				
Asociaciones de INI con ITINN	DTG/RPV	1 comp/24h	Con alimentos	JULUCA®	50/25 mg				
Inhibidores de los correceptores CCR5	MARAVIROC	300 mg/12h (600 mg/12h si solo inductores potentes CYP3A4) (150 mg/12h si inhibidores potentes CYP3A4, aunque se asocien inductores)	Indiferente	CELENTRI®	150 mg 300 mg				
Inhibidor de la fusión	ENFUVRTIDE	90 mg/12h sc	No procede	FUZEON®					90 mg/ml.

^o Disponible a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales

^o En adultos con funciones hepática y renal normales